eurofins | Biomnis

Protocole
Kit Ana Choc
Trousse pour l'exploration in vitro d'un choc anaphylactoïde

Conservation du kit à température ambiante, date de péremption indiquée sur les tubes

Biologistes

Christine BOUZ Tél : 04 72 80 73 36
Laurence GUILLOUX Tél : 04 72 80 73 10

Eurofins Biomnis

Site de Lyon 17/19 avenue Tony Garnier 69007 LYON
Site de Paris 78 avenue de Verdun 94200 IVRY-SUR-SEINE

MÉDECIN PRESCRIPTEUR

Nom du médecin : .....
Prénom : .....
Adresse : .....
CP : ⌊⌊⌊⌊⌊ Ville : .....
Tél : .....

Identification de l'hôpital ou du laboratoire

Obligatoire
Coller ici votre étiquette d'identification

PATIENT(E)

☐ Mme ☐ M. Sexe : ☐ F ☐ M

Nom : .....
Prénom : .....
Date de naissance : ⌊⌊ ⌊⌊ ⌊⌊⌊⌊

Adresse : .....
CP : ⌊⌊⌊⌊⌊ Ville : .....

Date et heure du prélèvement IMPÉRATIVEMENT :
⌊⌊ ⌊⌊ ⌊⌊ **T0 heure =** ..... **T1 heure =** .....

PROTOCOLE DE PRÉLÈVEMENT APRÈS LE DÉBUT DES SYMPTÔMES

ADRESSER IMPÉRATIVEMENT TOUS LES TUBES SI POSSIBLE CENTRIFUGES ET DECANTES DANS LE MÊME SACHET

T0 15 à 30 min après	T1 1 à 2 h après	Recommandations	Conservation
HISTAMINE	HISTAMINE	Tube EDTA Conservation du sang total 2h à t° ambiante, ou 12 h à +4 °C Dans ce temps, centrifuger 10 minutes à 800 g Décanter loin du culot.	Exclusivement plasma EDTA non hémolysé congelé (< -18 °C)
TRYPTASE	TRYPTASE	Sérum, plasma hépariné possible Pas de tube fluoré	Sérum +4 °C
IGE SPECIFIQUES		Sérum, plasma hépariné possible	Sérum +4 °C

Préciser les IgE spécifiques à tester :

☐ Formol ☐ Latex ☐ Pénicillines : .....
☐ Oxyde d'éthylène ☐ Ammonium IV, préciser le curare : ..... ☐ Autres : .....

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Allergènes suspectés et délai d'apparition des symptômes après administration : .....
.....

Symptômes :

☐ Signes cutanés isolés ☐ Réaction systémique modérée ☐ Réaction mettant la vie en danger ☐ Arrêt cardiaque ou respiratoire

Autres réactions cliniques observées : .....
Circonstances d'apparition (préciser) : .....
Antécédents d'allergie : .....

Ci-joint la fiche de **Prise en charge d'un choc anaphylactique**, éditée par la **SFAR** (à noter qu'elle préconisait un protocole simplifié en un temps), les nouvelles recommandations d'experts actualisées en mars 2011 recommandent 2 temps (voir RFE 2011, site www.sfar.org).

Réservé
Laboratoire Biomnis

K2B - Novembre 2017