



TEST AU CRF

A JEUN et AU REPOS

Prévoir une ampoule de Stimu ACTH 48 h à l'avance
(commander 3 jours avant au minimum)

A 8 h du matin (ou à 8h le soir en fonction des prescriptions du médecin).

Peser le patient avant la commande

Déroulement de l'épreuve

T- 15 mn ACTH et Cortisol (1 tube violet à +4°C et 1 tube jaune)

T0 ACTH et Cortisol (1 tube violet à +4°C et 1 tube jaune)

Puis administrer **1 µg / kg** de poids en IVD sous la forme d'un **bolus de CRF**
(solvant = sérum physiologique, ampoule de 100 µg / mL de **Stimu ACTH**
à commander une semaine à l'avance le produit à la pharmacie)

T + 5 mn ACTH et Cortisol (1 tube violet à +4°C et 1 tube jaune)

T + 15 mn ACTH et Cortisol (1 tube violet à +4°C et 1 tube jaune)

T + 30 mn ACTH et Cortisol (1 tube violet à +4°C et 1 tube jaune)

T + 60 mn ACTH et Cortisol (1 tube violet à +4°C et 1 tube jaune)

T + 90 mn ACTH et Cortisol (1 tube violet à +4°C et 1 tube jaune)

T + 120 mn ACTH et Cortisol (1 tube violet à +4°C et 1 tube jaune)

T + 150 mn ACTH et Cortisol (1 tube violet à +4°C et 1 tube jaune)

T + 180 mn ACTH et Cortisol (1 tube violet à +4°C et 1 tube jaune)

DESCENDRE RAPIDEMENT LES TUBES AU LABORATOIRE
A DEFAUT : GARDER AU REFRIGERATEUR