



LABM CH Cornouaille
BP 1757 DRM Av
Y.Thepot
29107 Quimper Cedex

TEST AU SYNACTHENE IMMEDIAT

Ref : MO-RIS-PREL-001-01

Version : 01

Applicable le : 04-07-2016



TEST AU SYNACTHENE IMMEDIAT

But du test : exploration de la capacité sécrétoire de la corticosurrénale.

Conditions Initiales du patient : Le matin à **8h précisément**
A jeun depuis 12h
Au repos depuis 30 mn
Arrêt des corticoïdes 48h avant

Produit administré en IM : 1 ampoule de 0,25 mg de **Synacthène Immédiat** (IM)
(consult.labo : à se procurer en pharmacie de ville)

Déroulement de l'épreuve : Au repos pendant le test

Test « Classique » sur 1h

T 0 : Cortisol (1 tube jaune)
puis **injection IM** d'une ampoule de 0,25 mg de **Synacthène Immédiat**
T + 30 mn : Cortisol (1 tube jaune)
T + 60 mn : Cortisol (1 tube jaune)

Version « service Endocrinologie CHIC » sur 1h30

T - 30 mn : Cortisol (1 tube jaune)
T - 15 mn : Cortisol (1 tube jaune)
T 0 : Cortisol (1 tube jaune)
puis **injection IM** d'une ampoule de 0,25 mg de **Synacthène Immédiat**
T + 30 mn : Cortisol (1 tube jaune)
T + 60 mn : Cortisol (1 tube jaune)

Précisez si dosages complémentaires (prélever des tubes supplémentaires) :

A T0, T+30 et T+60 : **Aldostérone** (1 tube violet)
17 OH Progestérone (1 tube jaune)
Composé S (2 tubes jaunes)

Garder les tubes au réfrigérateur jusqu'à la fin de l'épreuve

Réponse normale : 50 à 100 % d'augmentation du cortisol.