



## TEST DE FREINAGE FORT AU DEXAMETHAZONE

### A JEUN et AU REPOS depuis 0 h

BUT : Suspicion de Cushing

#### Jour 1 :

Poser flacon 17 Céto-17 OH

A 8 h Cortisol (base) (1 tube bouchon jaune)  
Composé S (base) (2 violets)

On donnera le **DECTANCYL** pendant **5 jours** de suite, aux mêmes doses et aux mêmes heures.

#### Jour 2 :

Relever flacon U 17 Céto-17 OH + CLU (Cortisol Libre Urinaire)

Reposer un autre flacon

A 8h Donner **4 comprimés** de 0,5 mg de DECTANCYL

A 14 h Donner **4 comprimés** de 0,5 mg de DECTANCYL

A 20 h Donner **4 comprimés** de 0,5 mg de DECTANCYL

A 2h Donner **4 comprimés** de 0,5 mg de DECTANCYL

#### Jour 3 – J 4 – J 5 – J 6 :

Relever flacon U : Faire 17 Céto-17 OH + CLU

Reposer un autre flacon

A 8h Cortisol (1 tube bouchon jaune)  
Composé S (2 violets)

Donner **4 comprimés** de 0,5 mg de DECTANCYL

A 14 h Donner **4 comprimés** de 0,5 mg de DECTANCYL

A 20 h Donner **4 comprimés** de 0,5 mg de DECTANCYL

Cortisol (1 tube bouchon jaune)

A 2h Donner **4 comprimés** de 0,5 mg de DECTANCYL

#### J 7 :

Relever flacon U : Faire 17 Céto-17 OH + CLU

Reposer un autre flacon

A 8h Cortisol (1 tube bouchon jaune)  
Composé S (2 violets)

A 20 h Cortisol (1 tube bouchon jaune)

#### J 8 :

Relever flacon U : Faire 17 Céto-17 OH + CLU