



## HYPOGLYCEMIE INSULINIQUE

### A JEUN AU REPOS

BUT : Stimulation HGH et Cortisol.

#### Déroulement de l'épreuve :

<b>T – 30 mn</b>	}	Glycémie	(1 gris)
<b>T – 15 mn</b>		Cortisol	(1 jaune)
		ACTH	(1 violet à +4°C)
		Glycémie capillaire	(noter dans le dossier)
<b>T 0</b>		GH	(1 rouge ou tube de purge)

Puis injection d'**INSULINE** rapide : HUMALOG rapide  
0,10 unités / kg en IVD  
0,15 unités / kg si obèse

<b>T + 20 mn</b>	}	Glycémie	(1 gris)
<b>T + 40 mn</b>		Cortisol	(1 jaune)
<b>T + 60 mn</b>		ACTH	(1 violet à +4°C)
		Glycémie capillaire	(noter dans le dossier)
		GH	(1 rouge ou tube de purge)
<b>T + 90 mn</b>			
<b>T + 120 mn</b>			
<b>T + 180 mn</b>			

(Les deux premières bases sont facultatives, voir avec le médecin).

Incidents à craindre : malaise, coma hypo.

Prévoir une seringue de sérum glucosé Hyper (**Ne jamais injecter sans l'avis du médecin**), jamais de Glucagon. Noter la quantité d'Insuline injectée sur les bons et l'heure d'apparition du malaise.

Descendre rapidement les tubes au laboratoire  
ou  
garder à +4°C